

SER EXAMINADA ES FÁCIL

Proporcionar una muestra para la detección es fácil y sin dolor. El médico puede recoger una muestra con un algodón vaginal o por la recogida de una muestra de orina.

Si su resultado es positivo, no está solo. Millones de personas tienen un resultado positivo de ITS cada año. Afortunadamente, las infecciones de clamidia y gonorrea pueden tratarse con antibióticos. Es muy importante terminar todos los antibióticos que se prescriben para usted. Su pareja también debe examinado y tratado.

Si su resultado es negativo, buenas noticias!




PROTÉJASE: HAGASE LAS PUEBAS. RECIBIR TRATAMIENTO.

Usted puede tomar el primer paso para proteger su salud a partir de una conversación con su médico hoy.

Una ITS no tratada puede tener consecuencias graves para su salud a largo plazo. **Puede tomar el control de su salud sexual** y protegerse de complicaciones innecesarias en el futuro. Su médico puede responder a sus preguntas sin juicio.

www.ashasexualhealth.org
www.yesmeanstest.org



LA CLAMIDIA Y GONORREA: MÁS COMÚN Y MÁS CURABLE DE LO QUE CREES.

Infecciones de transmisión sexual (ITS) son mucho más comunes que usted puede pensar. Dos de las más frecuentes ITS, clamidia y gonorrea, son infecciones bacterianas que pueden transmitirse por contacto sexual.

Hay unos 3.6 millones de casos de clamidia y gonorrea diagnosticados en los Estados Unidos cada año.

Aproximadamente la mitad de las infecciones de gonorrea y el 65% de las infecciones por chlamydia ocurren en personas jóvenes, entre 15 y 24 años.

A menudo **no hay signos o síntomas con clamidia o gonorrea**, especialmente en las mujeres. Por eso es importante hablar con su médico sobre qué pruebas son adecuadas para usted.

Si usted ha tenido sexo, puede que necesite ser probado, aunque se sienta sana.

CONSECUENCIAS DE LA INFECCIÓN NO TRATADA

Es generalmente fácil de tratar la clamidia y la gonorrea; sin embargo, una infección no tratada puede causar consecuencias para la salud. Incluyen:

- Daños irreversibles en sus órganos reproductivos, incluyendo la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Esto puede conducir a la **infertilidad** (incapacidad para tener hijos) y **embarazo ectópico** (un embarazo peligroso que ocurre fuera del útero).
- **Parto prematuro para mujeres embarazadas**, que puede causar complicaciones graves para la salud de las madres y sus bebés. **Ambas infecciones también pueden difundir a los recién nacidos** durante el parto y causar infección de ojo o pulmón.

MIENTRAS QUE USTED NO QUIERA A BEBÉS HOY EN DÍA, LAS ITS PUEDEN AFECTAR SU CAPACIDAD PARA TENERLOS EN EL FUTURO

¿DEBO SERME LA PRUEBA PARA CLAMIDIA Y GONORREA?

Los centros de Control y prevención de enfermedades recomienda lo siguiente:

Mujeres sexualmente activas menores de 25 (**examen anual**)

Clamidia
Gonorrea

✓ ✓

Mujeres de 25 años en adelante en aumento riesgo^a

✓ ✓

Mujeres embarazadas durante su primer trimestre, así como las mujeres en su tercer trimestre que son menores de 25 años, encontrados para ser infectados en el primer trimestre o en las mujeres mayores en aumento riesgo^{a,b,c}

✓ ✓

Hombres y mujeres que resultaron positivo deben de analizarse a los 3 meses

✓ ✓

^a Personas con mayor riesgo son las mujeres con nuevas o múltiples parejas, tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, intercambio de sexo por pago y uso de drogas de inyección, con una nueva pareja sexual, más de una pareja sexual, una pareja sexual con los socios concurrentes o una pareja sexual que tiene un sexo infección de transmisión individual.

^b El CDC recomienda que todas las mujeres embarazadas que tienen infección por Chlamydia deben tener una prueba de cura (preferiblemente por NAAT) 3 a 4 semanas después del tratamiento y analizar a los 3 meses.

^c El CDC recomienda que todas las mujeres embarazadas encuentran tener infección gonocócica debe ser tratada inmediatamente y a analizar dentro de 3 meses.